

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

Som led i din fertilitetsbehandling kan det være relevant at foretage en undersøgelse af passageforholdene i æggelederne. For at opnå graviditet ved samleje eller inseminationsbehandling er det en betingelse, at der er passage gennem mindst 1 af dine æggeledere. Æggelederne kan nemlig være aflukkede efter en underlivsinfektion, f.eks. klamydia, eller en operation i mave/underliv.

Forberedelse

Undersøgelsen foretages mellem 5.- 10. cyklusdag. Du skal kontakte klinikken på 1. blødningsdag og aftale tid til HSU.

Undersøgelse

Varighed 5-10 minutter.

Enkelte kvinder vil opleve lette menstruationslignende smerter under og efter undersøgelsen – dette kan forebygges ved at tage 1 g Panodil og 400 mg Ipren 1 time før mødetid.

Ved undersøgelsen føres et tyndt plastkateter igennem livmoderhalsen og op i livmoderen. Herefter sprøjtes kontrastvæske op i livmoderen. Ved samtidig at ultralydsscanne, kan det vurderes, om væsken passerer ud i æggelederne.

Efter undersøgelsen planlægges det videre forløb i din barnløshedsbehandling. Du kan gå på arbejde umiddelbart efter undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

I forbindelse med indgrebet er der en minimal risiko for infektion. Får du, i de efterfølgende dage, smerter, feber eller ildelugtende udflåd, skal du kontakte klinikken/ vagtlægen.